

Traitement de l'insuffisance cardiaque chronique à FE altérée

(1 par catégorie)



	CI	EI
<p>Inhibiteurs du SRAA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEC - ARA2 - Entresto = Sacubitril+Valsartan 	<ul style="list-style-type: none"> - IEC : <ul style="list-style-type: none"> • Sténose bilatérale des artères rénale • Grossesse • Hyperkaliémie - ARA2 : CI si présence d'un IEC + ARM - Entresto : hyperkaliémie majeure, IR terminale, insuffisance hépatique sévère, cirrhose biliaire ou cholestase, grossesse 	<p>Entresto : hypotension, hyperkaliémie, altération de la fonction rénale</p>
<p>β-bloquants = carvédilol, bisoprolol, nébivolol, métoprolol</p>	<p>Cf. tableau FA</p>	<p>Cf. tableau FA</p>
<p>ARM/Anti-aldostérone</p>	<p>Insuffisance rénale sévère Hyperkaliémie majeure</p>	<p>Insuffisance rénale, hyperkaliémie</p>
<p>Inhibiteurs SGLT2 (cotransporteur sodium-glucose de type 2)</p>	<p>IR avec DFG < 25mL/min</p>	<p>Hypotension (surtout orthostatique), hypoglycémie, infections urinaires et génitales car glycosurie, élévation de la clairance de la créatinine lors de l'introduction</p>
<p>Diurétiques de l'anse +/- thiazidique</p>	<p>Encéphalopathie hépatique, allaitement</p>	<p>Hypokaliémie, déshydratation</p>